

ÎNTREBĂRI, JURNALUL DE CHIRURGIE, Nr. 3/2010

- 1. Care a fost primul simulator folosit în antrenamentul din chirurgia laparoscopică:**
 - a. simulatorul MIST-VR
 - b. simulatorul LAP SIM VR
 - c. simulatorul LAP MENTOR
 - d. SINERGIA laparoscopic VR
 - e. consola robotică

- 2. Ce markeri tumorali au îmbunătățit substanțial sensibilitatea testului pentru depistarea hepatocarcinomului pe ciroză:**
 - a. alfa-proteina L3
 - b. des-gamma-carboxiprotrombina
 - c. proteina Golgi 73
 - d. glipican 3
 - e. combinația dintre Ag carcinomului cu celule scuamoase și alfa-fetoproteine

- 3. Care este cea mai frecventă complicație a drenajului endoscopic al pseudochisturilor de pancreas:**
 - a. hemoragia
 - b. perforația
 - c. ocluzia stentului și infecția
 - d. pancreatita acută
 - e. migrarea stentului

- 4. Ce an este declarat simbolic „anul Thoma Ionescu” deoarece se împlinesc 150 de ani de la nașterea sa și 100 de ani de la renumitul turneu demonstrativ din Europa și America de Nord:**
 - a. 2008
 - b. 2009
 - c. 2010
 - d. 2011
 - e. 2012

- 5. Cea mai frecventă localizare intraabdominală a metastazelor melanomului malign cutanat este:**
 - a. esofagul
 - b. stomacul
 - c. intestinul subțire
 - d. colonul
 - e. rectul

- 6. Care tip de esofagoplastie se practică în stenozele esofagiene postcaustice:**
- plastii colice stângi retrosternale izoperistaltice
 - plastii ileocolice retrosternale izoperistaltice
 - plastii colice stângi presternale anoizoperistaltice
 - by-pass gastric retrosternal
 - plastii ileocolice retrosternale anizoperistaltice
- 7. Care este cea mai frecventă complicație care apare în evoluția postoperatorie după esofagoplastia cu ileocolon:**
- bronho-pneumonia
 - pneumotorax postoperator
 - necroză totală de transplant ileocolic
 - fistulă de anastomoză cervicală
 - necroză parțială de grefon ileocolic
- 8. La ce interval de timp după ingestia causticului se recomandă să se efectueze esofagoplastia:**
- imediat
 - la o săptămână
 - la o lună
 - la 2-3 luni
 - la un an
- 9. Ce metode de tratament ameliorează prognosticul în carcinomatoza peritoneală după cancerul de sân operat:**
- radioterapia
 - imunoterapia
 - citoreducția tumorală
 - nici un tratament
 - chimioterapia intraperitoneală
- 10. Care sunt indicațiile utilizării NovoSeven-ului:**
- hemofilia tip A
 - hemofilia tip B
 - trombastenia Glanzmann
 - hemoragiile acute postoperatorii
 - toate cele menționate mai sus

RASPUNSURI:

1. A
2. E
3. A
4. C
5. C
6. A, B, D
7. D
8. D
9. C, E
10. E